Secuelas salud de las mujeres Víctimas de la Violencia de Género



M.Carmen Castillo Rubio

Trabajadora Social del Centro de Salud de Lora del Río

Índice

1 OMS

2 Estimaciones y estadísticas

3 Proceso de violencia contra las mujeres

4 Adherencia al Vínculo Traumático

5 Ambivalencia Emocional

6 Sintomatologías

1

OMS

Salud y violencia de género



1.1 Salud

El estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente, la ausencia de enfermedad o dolencia

1.2 Violencia de Género

- Cualquier acto, que tenga como consecuencia, o que tenga posibilidad de tener, como consecuencia, perjuicio o sufrimiento, en la salud física, sexual, o psicológica de la mujer, incluyendo amenazas de dichos actos, coerción o privación arbitraria de su libertad, tanto si se producen en la vida pública, como privada.

- La Violencia de Género es un gran problema de salud.

- Constituye una violación de los derechos humanos de las mujeres .

2

Estimaciones y estadísticas

OMS

- Una de cada 3 mujeres (30%) en el mundo, ha sufrido violencia física y/o sexual de su pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida.
- Casi un tercio (27%) de las mujeres de 15 a 49 años han estado en una relación donde han informado haber sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja .

Delegación de gobierno contra la violencia de género

- Nº de mujeres fallecidas en España 2023 asciende a 12.
- Nº de mujeres fallecidas en Andalucia 2023 asciende a 5.

3

Proceso de Violencia Contra las Mujeres



Objetivo Destrucción de la Identidad de la mujer




- Base cultural patriarcal
- Proceso de dominio
- Falso vínculo afectivo
- Tácticas de persuasión coercitivas:

- Técnicas comportamentales: aislamiento,control.
- Técnicas emocionales: chantaje, desprecio, amenaza.
- Agresiones físicas, directas, indirectas o ambientales

4

Adherencia al Vínculo Traumático



Victimización Intrínseca = Trauma Intrapsíquico

Mecanismos inconscientes de supervivencia:

- Indefensión o impotencia aprendida (aparente sumisión)
- Modificación de conducta o disociación (trance. Anestesia sensitiva)
- Síndrome de estocolmo de la mujer maltratada (identificación maltratador)



Victimización Extrínseca = Factores sociales y culturales

- Etnia.
- Edad.
- Embarazo.
- Personas dependientes y menores a su cargo.
- La única que provee recursos económicos y posea deudas .
- No ser dueña de sus propiedades .
- Incredulidad profesionales.
- Falta de apoyo institucional

5

Ambivalencia Emocional



Mujer con plena capacidad se ha convertido en Víctima.

- **Conductas ambivalentes**:
  - Miedo.
  -Culpa.
  -Desconfianza .
  -Pena.
  -Odio.
  -Soledad.
  -Vergüenza.
  -Etc.

6

Sintomatologías



6.1 Síntomas Psicológicos frecuentes

- Ansiedad.
- Depresión.
- Baja autoestima.
- Irritabilidad.
- Agotamiento psíquico.
- Abuso psicofármacos.
- Insomnio.
- Trastorno de estrés postraumático.
- Otros.

6.2 Síntomas Físicos frecuentes

- Dolor crónico en general.
- Traumátismos.
- Cefaleas.
- Mareos.
- Dificultades respiratorias.
- Otros.

6.3 Problemas Gineco-Obstétricos

- Ausencia de control de la fecundidad.
- Lesiones genitales .
- ITS.
- Dolor pélvico.
- Abortos repetidos.
- Infecciones repetidas.
- Hijos de bajo peso al nacer.
- Otros

6.4 Somatización de enfermedades

- ICTUS
- Enfermedades autoinmunes:
  -Celiaquía.
  -Esclerosis múltiple.
  -Diabetes tipo I.
  -Lupus.
  -Artritis reumatoidea.
  -Tiroiditis.
  -Otros.